

Детские заболевания

Для болезней, получивших название детских инфекций, характерно то, что болеют ими, как правило, в детстве. К острым детским инфекциям относят: корь, краснуху (красную сыль), скарлатину, дифтерию, коклюш, эпидемический паротит (свинку), ветряную оспу и полиомиелит.

Большинство этих болезней очень быстро распространяется и при этом поражает большое количество детей. У людей, переболевших ими, вырабатывается довольно стойкий иммунитет (исключение составляет скарлатина).

Вакцинация помогла снизить заболеваемость. Однако вакцины не всегда дают стойкий иммунитет. Вдобавок, по разным причинам, не все дети имеют профилактическую прививку.

Предупреждение инфекций является главным принципом сохранения здоровья детей.

Если ребенок заболел, его поведение меняется: он плачет, отказывается от пищи, становится вялым, не играет. Не расстраивайтесь — немедленно обратитесь к врачу!

**Не занимайтесь самолечением!
При первых симптомах болезни —
обращайтесь к врачу!**

Профилактика инфекционных заболеваний

Инфекционные заболевания возникают вследствие проникновения в организм человека болезнетворных микроорганизмов (бактерий, вирусов или простейших) и размножение их там.

Профилактика инфекционных заболеваний проводится по трем направлениям.

Первое — выявление и изоляция источника инфекции, второе — исключение механизмов передачи инфекции, третье — повышение иммунитета организма ребенка к инфекционным заболеваниям.

Большинство родителей понимает, что благодаря простой профилактике болеть ребенок будет меньше, а лечение (если он все-таки заболеет) будет не таким продолжительным и дорогостоящим. Если своевременно делать прививки и профилактические осмотры, то поводов для посещения врача будет меньше, а любые отклонения в развитии ребенка будут своевременно выявлены.



Эпидемический паротит (свинка)

Острое вирусное заболевание, которое характеризуется общей интоксикацией, поражением слюнных желез, а также нервной, пищеварительной и половой систем.

Надо знать!

- Свинку можно предупредить, сделав ребенку прививку!
- Возбудитель болезни — фильтрующий вирус, который находится в слюне больного, передается воздушно-капельным путем. Нестойкий вине организма, возбудитель свинки не переносится третьим лицом и очень редко передается через посуду, игрушки, книги, носовые платки.
- Инкубационный период — от 11 до 21 суток. Больной заразен за два дня до начала и в течение всей болезни.
- После перенесения болезни возникает стойкий иммунитет.

Симптомы болезни:

- увеличение слюнных желез;
- центр отухания — мочка уха с одной или обеих сторон, сухость во рту и боль в ухе при открытии рта и жевании;
- небольшое повышение температуры;
- плохой аппетит.

Что проверять:

- температуру тела;
- не появились ли боли в яичках (у мальчиков), в животе, головная боль;
- болезненность в месте отухания при движении челюсти.

Краснуха (красная сыпь)

Острое инфекционное заболевание, которое сопровождается сыпью.

Надо знать!

- Возбудитель болезни — фильтрующий вирус. Краснуха напоминает корь, но переносится легче. Симптомы заболевания минимальные.
- Прививка от краснухи обеспечивает стойкий иммунитет.
- Передается болезнь только от больного воздушно-капельным путем.
- Ребенок заразный за 7 дней до появления сыпи и через 5 суток после ее исчезновения.
- Инкубационный период — 14—21 день.
- После краснухи остается стойкий иммунитет на всю жизнь.
- Иногда болезнь осложняется энцефалитом или повышенным кровотечением.

Симптомы болезни:

- заболевание обычно протекает в легкой форме, поэтому симптомы тяжело определить;
- небольшая температура и насморк, через 1—2 дня — сыпь;
- увеличение и болезненность заднешейных и затылочных лимфатических узлов, которые возникают за 1—3 суток до сыпи и исчезают через несколько суток после исчезновения ее;
- сыпь — маленькие, красные, немного выпуклые пятнышки, обычно появляются сначала на лице и в течение суток распространяются по всему телу. Сыпь исчезает, как правило, через 3—5 суток.

Что проверять:

- общее состояние ребенка;
- температуру тела.

Скарлатина

Острое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, лихорадкой, воспалением небных миндалин и точечной сыпью по всему телу.

Надо знать!

- Возбудитель болезни — стрептококк. Источником инфекции является больной, который распространяет вирус воздушно-капельным путем. Чаще всего вирус проникает в организм через глаза и нос, иногда через пораженную ожогом или раной кожу.
- Возбудитель болезни может существовать и вне организма человека, поэтому одежда больного, его вещи, книги, игрушки, которыми он пользовался, могут быть источником распространения инфекции.
- Инкубационный период от 1 до 7 суток, иногда до 12 суток.
- После перенесенной болезни возникает иммунитет, но возможны повторные случаи заболевания скарлатиной, связанные с ослаблением защитных сил организма.
- Осложнения возникают редко, но могут быть опасными.

Симптомы болезни:

- часто болезнь начинается с головной боли, рвоты, боли в горле, повышенная температура;
- сыпь в виде мелких ярко-розовых точек на покрасневшей коже появляется по всему телу в 1—2 сутки болезни;
- характерным признаком скарлатины является резкий контраст между ярко-красными «пылающими» щеками и бледным носогубным треугольником, на коже которого элементы сыпи отсутствуют;
- сыпь наиболее выражена в паху, в подмышках, на внутренних поверхностях рук и ног;
- могут увеличиться лимфатические узлы на шее.

Что проверять:

- общее состояние ребенка;
- температуру тела.

Коклюш

Тяжелая инфекция дыхательных путей, которая вызывает сильный кашель.

Надо знать!

- Дети рождаются без иммунитета к коклюшу, поэтому без прививки они могут заболеть на первом году жизни.
- Без лечения коклюш может стать причиной смерти, особенно у маленьких детей.

Симптомы болезни:

- спазматический кашель, который перерывается судорожным вдохом;
- иногда кашель заканчивается рвотой;
- кашель длится долго;
- появление кашля предваряет увеличение температуры до 37—38 градусов.

Что проверить:

- была ли прививка от коклюша.



Ангина (воспаление миндалин)


Надо знать!

- Острое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей.
- Миндалины — часть лимфатической системы. Они играют важную роль в поддержании здоровья.
- Хирургическое вмешательство проводят тогда, когда другие методы лечения оказываются неэффективными.

Симптомы болезни:

- боль в горле, увеличение миндалин, налет или бледно-желтые точки на них
- общее недомогание, снижение аппетита, головная боль;
- повышенные температуры.

**Хотя боль в горле — это неопасное состояние,
но вызвать врача надо обязательно!**



Ветряная оспа

Ветряная оспа — это вирусная болезнь, во время которой на коже и слизистой оболочке появляются зудящие пузырьки. Она легко передается воздушно-капельным путем.

Надо знать!

Возбудитель болезни — фильтрующий вирус — очень летучий и подвижный, он может проникать сквозь окна, дверь, щели в стенах, из этажа на этаж, из помещения в помещение. Но он неустойчив вне организма человека. Возбудитель ветряной оспы быстро погибает, он не передается через третье лицо и вещи.

- Инкубационный период болезни от 11 до 21 суток.
- Ребенок, переболевший ветряной оспой, приобретает стойкий иммунитет.
- Заразными больные ветряной оспой становятся за 20—24 ч до появления сыпи и остаются ими до 5-го дня с момента регистрации последнего пузырька.

Симптомы болезни:

- небольшая температура;
- слабость, головная боль;
- сыпь: мелкие красные прищечки, которые превращаются в пузырьки, потом подсыхают и образуют струпья;
- сыпь появляется группами на протяжении нескольких дней, поэтому одновременно можно видеть разные этапы развития болезни.

Что проверять:

- каждый день осматривайте сыпь, убедите ребенка, что нельзя расчесывать пузырьки, так как это может привести к появлению шрамов и вызвать повторную инфекцию;
- дети в возрасте до 7 лет, которые были в контакте с больным ветряной оспой и не болели ею, изолируются на 21 сутки со времени контакта.

Нельзя давать аспирин (угроза осложнений)!

Корь

Острая вирусная болезнь, которая сопровождается повышенной температурой, насморком, кашлем, появлением красной пятнистой сыпи.

Надо знать!

- Возбудитель болезни — фильтрующий вирус — очень летучий и почти не жизнеспособный вне организма человека.
- Источником вируса является больной человек. Распространяется вирус воздушно-капельным путем.
- Больные опасны в последние дни инкубационного периода и в начале заболевания.
- Инкубационный период 9—11 дней (иногда 14—17), у детей, которым введен гамма-глобулин, — 21 день.
- Болезнь может вызвать осложнения.
- Детям, не имеющим прививки, назначают гамма-глобулин.

Симптомы болезни:

- проявляются через 10—17 дней после контакта. Ребенок заразный для окружающих даже на 5-е сутки после появления сыпи;
- начало кори похожее на сильную простуду (кашель, насморк, покраснение глаз, слезоточивость, высокая температура);
- новое повышение температуры происходит на 4-е сутки. Появляется сыпь; сначала на лице и шее, потом на протяжении 3-х дней — по всему телу;
- появляется повышенная чувствительность к свету.

Что проверять:

- общее состояние ребенка;
- температуру тела.